

TOBACCO-FREE COALITION

of Lancaster County

Hoja de Datos 10 –Habito de Fumar y el Embarazo

Datos

- El 12.3% de las mujeres que dan a luz, reportan haber fumado durante el embarazo.
- Una mujer embarazada que fuma tiene entre 1.5 a 3.5 veces más riesgos de dar a luz un bebé de bajo peso, que una que no fuma.
- Infantes cuyas madres fumaron durante el embarazo, tienen 2.3 veces más riesgos de sufrir del síndrome de muertes súbitas comparados a bebés de madres no fumadoras.
- Infantes expuestos al humo del cigarrillo por sus madres antes y después del embarazo, tienen 3 veces más riesgos de padecer de síndrome de muerte súbita.
- se estima anualmente que entre 150.000 y 300.000 casos de infecciones respiratorias en infantes y menores de edad pueden ser atribuidas al humo de segunda mano.
- La mayoría de los bebés que son expuestos al humo de segunda mano lo son por medio de sus madres.
- El fumar cigarrillo aumenta el riesgo de tener un embarazo ectópico.
- El fumar cigarrillo aumenta el riesgo de tener un aborto espontáneo.
- Los bebés de madres que dejaron el hábito de fumar durante el primer trimestre del embarazo, tienen un peso y estatura equivalente a los bebés con madres no fumadoras.